

Uso del Tabaco y Etnicidad

Prevalencia

Adultos

Según las últimas cifras de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, el 24,7 por ciento de adultos americanos son fumadores activos.¹ Por género, la cifra es 27,6 por ciento de varones y 22,1 por ciento de mujeres.

La variación en las tasas de prevalencia de fumadores entre grupos raciales/étnicos es considerable, contando con datos de calidad y recientes para los grupos caucásicos, afroamericanos, e Hispanos y con relativamente poca disponibilidad de datos actuales sobre Indios Americanos/Nativos de Alaska y Asiático-Americanos/Isleños del Pacífico.

Indios Americanos/Nativos de Alaska

- Los Indios Americanos/Nativos de Alaska adultos componen las tasas de uso de tabaco más altas de todo los grupos raciales/étnicos en América, llegando al 34,1 por ciento (37,9% de hombres y 31,3% de mujeres).²
- 14 por ciento de Indios Americanos varones y 2 por ciento de Indias Americanas que consumen tabaco de inhalar o masticar comparado al 5,2 por ciento de varones y 1,5 por ciento de mujeres de la población general.³

Asiático-Americanos/Isleños del Pacífico

- Los Asiático-Americanos/Isleños del Pacífico componen las cifras de prevalencia más bajas de los principales grupos raciales/étnicos americanos, con sólo 16,9 por ciento de adultos que actualmente fuman (21,6% de hombres y 12,4% de mujeres).⁴
- Un revisión estrecha de la población Asiática-Americana/Isleños del Pacífico muestra que ciertos subgrupos que viven en los Estados Unidos poseen tasas de fumadores relativamente altas.⁵

- continúa -

Uso del Tabaco y Etnicidad/ 2

Afroamericanos

- 26,7 por ciento de afroamericanos adultos son fumadores actuales, la segunda tasa más alta de cualquier grupo étnico principal. Por género, las tasas son 32,1 por ciento de hombres y 22,4 por ciento de mujeres.⁶
- 76 por ciento del total de fumadores afroamericanos consumen cigarrillos mentolados al compararlo con el 23 por ciento del total de fumadores Caucásicos.⁷
- Los afroamericanos tienden a iniciarse en el hábito de fumar a una edad más avanzada, es más probable que intenten abandonarlo, y tienen menos probabilidad de lograrlo que sus colegas caucásicos.⁸

Hispanos

- 20,4 por ciento de adultos hispanos (26,2% de hombres y 14,3% de mujeres) son fumadores actuales.⁹
- Entre los fumadores hispanos que viven en los estados continentales, los hombres cubanos (61,5%) y puertorriqueños (47,2%) fueron más probables a ser fumadores de peso (fumando más de 14 cigarrillos por día), comparado al 34,1 por ciento de fumadores mexicano-americanos varones.¹⁰
- Los fumadores hispanos (varones y mujeres) tienden a consumir menos cigarrillos que los caucásicos no hispanos. El 64,1 por ciento de fumadores hispanos fuman menos de 15 cigarrillos por día, comparado al 31,6 por ciento de fumadores no hispanos.¹¹

Juventud

Afroamericanos

- El hábito de fumar entre los estudiantes afroamericanos de escuelas secundarias se incrementó de 12,6 por ciento en 1991 a 22,7 por ciento en 1997.¹²
- El hábito de fumar entre los muchachos afroamericanos de escuelas secundarias casi se duplicó entre 1991 y 1997, de 14,1 por ciento a 28,2 por ciento.¹³ El hábito de fumar frecuentemente¹⁴ entre muchachos afroamericanos de escuelas secundarias también aumentó, de 4,5 por ciento en 1991 a 10,1 por ciento en 1997.
- Estas tendencias son particularmente alarmantes porque el hábito de fumar diariamente de las alumnas afroamericanas en su último año de escuela secundaria disminuyó en un ritmo constante de 24,9 por ciento en 1976 a sólo 4,1 por ciento en 1993. Como resultado, en 1993 la tasa diaria de fumadores para las alumnas afroamericanas mayores fue la quinta parte que para la caucásica.¹⁵ Las cifras para 1997 muestran que la juventud afroamericana está ahora alcanzando a la de sus colegas hispanos y caucásicos.

– continúa –

Uso del Tabaco y Etnicidad/ 4

- A pesar del aumento perturbador del hábito de fumar entre las muchachas afroamericanas, continúan fumando menos que las muchachas de otros grupos étnicos. En 1997, el 17,4 por ciento de muchachas afroamericanas eran fumadoras activas, comparadas con el 39,9 por ciento de sus pares mujeres caucásicas y el 32,3 por ciento de sus pares mujeres hispanas.¹⁶ Más aún, la cifra de fumadoras activas entre muchachas afroamericanas en 1995 representa una disminución de 2,2 por ciento del 14,4 por ciento en 1993, y en 1997, la tasa de fumar con frecuencia fue del 4,3 por ciento para este grupo racial/de género, el mismo nivel que en 1993.

Hispanos

- Entre 1991 y 1997, el hábito de fumar entre alumnos hispanos de escuelas secundarias se elevó de 25,3 a 34,0 por ciento.¹⁷ Las tasas para muchachas y muchachos son casi las mismas, las muchachas con 32,3 por ciento en 1997 (sobre el 22,9% en 1991) y de varones con 35,5 por ciento en 1997 (sobre el 27,8% en 1991).
- El hábito de fumar frecuentemente también está aumentando entre la juventud hispana, incrementándose de 6,8 por ciento en 1991 a 10,9 por ciento en 1997. Entre las mujeres, la tasa aumentó de 5,7 por ciento en 1991 a 8,1 por ciento en 1997. Para los varones, la cifra fue de 8,0 por ciento en 1991 y 13,2 por ciento en 1997.¹⁸

Asiático-americanos y Indios Americanos

- No se cuenta con datos muy actualizados sobre la prevalencia de la juventud asiática-americana y indio-americana que fuma. Según los datos agrupados del estudio <<Monitoring the Future>> de 1990-1994, años más recientes para los que se dispone de cifras de fumadores jóvenes, la prevalencia de haber fumado en el último mes de los nativos americanos varones en su último año de escuela secundaria es de 41.1 por ciento, y para las mujeres, de 39.4 por ciento.¹⁹
- Las tasas actuales de fumadores asiático-americanos en su último año de escuela secundaria fueron similares para chicos y chicas, en 17 y 14 por ciento,²⁰ respectivamente.

Morbilidad/Mortalidad

Asiático-Americanos/Isleños del Pacífico

- Las tasas de cáncer pulmonar de los inmigrantes de países asiáticos y sus descendientes que varían entre tasas bajas de sus países natales y las altas tasas de los Estados Unidos, sugiere que los factores medioambientales influyen en su riesgo de cáncer.²¹

Uso del Tabaco y Etnicidad/ 5

Indios Americanos

- De 1986-1988, las enfermedades relacionadas al tabaco fueron la causa de muerte de 9.566 indios americanos (44% de 22.943 muertes de indios americanos).²²
- La tasa de mortalidad entre indios americanos debido al abuso del tabaco es el doble de la tasa de mortalidad de otros individuos americanos en los Estados Unidos.²³ Un promedio de dos de cada cinco indios americanos muere por el uso del tabaco (distinta al uso ceremonial).²⁴

Afroamericanos

- Más de 47.000 afroamericanos mueren anualmente de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.²⁵
- Mientras que los afroamericanos fuman menos cigarrillos por día que los caucásicos, en promedio, tienden a fumar las marcas con niveles de nicotina más altos.²⁶
- Se cree que el fumar causa 87 por ciento del total de casos de cáncer pulmonar y es un factor que contribuye en cerca del 30 por ciento del total de muertes por cáncer.²⁷ Entre la población en general, el cáncer pulmonar totaliza el 14 por ciento de todos los cánceres; en los varones afroamericanos, la cifra es de 25 por ciento.²⁸
- La proporción de cáncer pulmonar/bronquial en varones afroamericanos es 50 por ciento más alta que para la de los varones caucásicos.²⁹
- La tasa de todos los tipos de cáncer en afroamericanos ha aumentado 66 por ciento entre 1957 y 1987 – principalmente debido al cáncer pulmonar. Durante los mismos 30 años, la tasa de cáncer pulmonar entre hombres afroamericanos aumentó el 259 por ciento y se cuadruplicó en el caso de mujeres afroamericanas.³⁰
- 76 por ciento de fumadores afroamericanos fuman cigarrillos mentolados comparado a sólo el 23 por ciento de fumadores caucásicos. Después de hacer un ajuste por raza, cigarrillos por día, y monto promedio de cigarrillos fumados, el mentol fue asociado con altos niveles de cotinina y concentraciones de monóxido de carbono que están asociados con el aumento de los riesgos de la salud a causa del hábito de fumar.³¹
- Debido a la sensación refrescante producida por el mentol, los fumadores pueden inhalar más profundamente y pueden sostener el humo dentro de los pulmones más tiempo que los fumadores de cigarrillos no mentolados. Este patrón de inhalación puede causar un daño mayor a la salud del fumador.³²

Uso del Tabaco y Etnicidad/ 6

Hispanos

- Entre hispanos, los hombres poseen una tasa de mortalidad por cáncer pulmonar aproximadamente tres veces que la de mujeres.³³

Filantropía

- La Cámara Hispana de Comercio de los EE.UU. recibió \$75.000 de Philip Morris y la misma cantidad de RJ Reynolds en 1994, y dos veces esta cantidad en los años anteriores. En 1994, el grupo envió por correo 92.000 cartas instando a los propietarios de comercios y a empleados que cabildeen en contra de un incremento propuesto en los impuestos al tabaco, basándose en el argumento que el impuesto perjudicaría a los hispanos en el negocio de ventas al por menor.³⁴
- El Proyecto 21, organización afroamericana conservadora que opera fuera del Centro Nacional para la Investigación de Políticas Públicas, está fuertemente financiada por RJ Reynolds. El presidente del grupo, Edmund Peterson, se opuso a la regulación de tabaco dictada por la Administración de Alimentos y Drogas y a otras políticas del gobierno para reducir el uso del tabaco.³⁵

###

-
- ¹ Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), "El Hábito de Fumar entre Adultos - Estados Unidos , 1995," *Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)*, 26 de diciembre de 1997, Vol. 46, No. 51. Fumadores activos se define como las personas que reportaron haber fumado ≥ 100 cigarrillos y que han reportado fumar todos o algunos días.
- ² *Ibid.*
- ³ The American Indian Cancer Control Project, 1991, Berkeley, CA. Oficina de Asuntos Indios, 1994.
- ⁴ CDC, *op. cit.*
- ⁵ Asociación Americana Pulmonar (American Lung Association, ALA).
- ⁶ CDC, *op. cit.*
- ⁷ CDC, *Disminución de las Consecuencias para la Salud a Causa de Fumar: 25 Años de Progreso – A Report of the Surgeon General, 1989.* Rockville, MD: Departamento de Servicios Humanos y de Salud (USDHHS), Servicio de Salud Pública, 1989; publicación de DHHS no. (CDC)89-8411. (datos de 1986)
- ⁸ USDHHS, *Uso del Tabaco entre Grupos Minoritarios Raciales/Etnicos de los EE.UU – Afroamericanos, Indios Americanos y Nativos de Alaska, Asiático Americanos e Isleños del Pacífico, e Hispanos: A Report of the Surgeon General,* Atlanta, GA: USDHHS, CDC, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, Oficina del Hábito de Fumar y Salud, 1998.
- ⁹ CDC, *MMWR*, 26 Diciembre de 1997, *op. cit.*
- ¹⁰ CDC, "Vigilancia del Comportamiento Selectivo del Uso del Tabaco – Estados Unidos, 1900-1994." *MMWR* 1994, Vol. 43, No. SS-03. (Conjunto de datos de 1987, 1988, 1990, 1991.)
- ¹¹ Centro Nacional de Estadísticas de Salud, *Encuesta Nacional de Entrevista de Salud, 1987-1991.*
- ¹² CDC, *Encuesta de Vigilancia de Comportamiento de Riesgo de la Juventud (YRBS),* Estados Unidos, 1991 & 1997. Fumadores activos se define como haber fumado >1 cigarrillo en los últimos 30 días.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ Definido como haber fumado >20 cigarrillos en los últimos 30 días.
- ¹⁵ Universidad de Michigan, Instituto de Investigación Social, "Resultados de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas del Estudio 'Monitoreo del Futuro', 1975-1997," Volumen 1, Estudiantes de Escuelas Secundarias. Instituto Nacional para el Abuso de Drogas (NIDA), publicación NIH No. 98-4345, 1998.
- ¹⁶ *YRBS*, 1997.
- ¹⁷ *YRBS*, 1991 y 1997.
- ¹⁸ *Ibid.*
- ¹⁹ USDHHS, *Prevención del Uso del Tabaco entre Gente Joven: A Report of the Surgeon General,* Atlanta, GA: USDHHS, Servicio de Salud Pública, CDC, Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, Oficina de la Salud y el Hábito de Fumar, 1994.
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ ALA – Asiático-Americanos/Isleños del Pacífico y Enfermedades Pulmonares (hoja de datos del web).
- ²² Proyecto de Control de Cáncer de Indios Americanos, *op. cit.*
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ ALA Hoja de Datos – Negros Americanos y Enfermedades Pulmonares.
- ²⁶ *Ibid.*
- ²⁷ ALA Hoja de Datos – el Hábito de Fumar y Enfermedades Pulmonares en Grupos Minoritarios.
- ²⁸ ALA Hoja de Datos – Negros Americanos y Enfermedades Pulmonares.
- ²⁹ 1998 Surgeon General's Report, *op. cit.*
- ³⁰ Sociedad Americana de Cáncer (American Cancer Society, ACS)
- ³¹ Colegio Americano de Médicos del Pecho (American College of Chest Physicians).
- ³² ALA.
- ³³ ALA Hoja de Datos – Hispanos y Enfermedades Pulmonares.

³⁴ "Invisiblemente, Campaña de Refutación de las Firmas de Tabaco en contra de los Altos Impuestos al Cigarrillo." *The Washington Post*, 26 de agosto de 1994.

³⁵ "The Right Brothers," *The Nation*, 4 de marzo de 1996.